

## ***I riflessi neonatali***

I riflessi neonatali sono reazioni automatiche del neonato che scompaiono con la maturazione del sistema neuronale.

- **Riflesso di moro (o riflesso di abbraccio)**

Sollevando il bambino dal piano prendendolo sotto la schiena e rilasciandolo successivamente, quando lo si tira per i piedi o si picchia sul cuscino dove è appoggiata la testa, si scatena una risposta riflessiva divisa in due momenti. Prima il bambino ha una brusca estensione e abduzione delle braccia, successivamente allarga le dita a ventaglio e gli arti superiori descrivono un arco di cerchio, come se fosse un abbraccio, per poi ritornare allo stato di flessione-adduzione. Il riflesso scompare prima dei 6 mesi.




- **Riflesso di raddrizzamento**

Tenendo il neonato sostenuto verticalmente in modo che le piante dei piedi poggino su un piano, si manifesta un riflesso d'estensione e raddrizzamento delle gambe e del tronco. Con un effetto "onda" dal basso all'alto, vengono interessate la caviglia, il ginocchio, l'anca, il tronco ed infine la testa. Questo scompare verso i 2-3 mesi.

- **Riflesso di deambulazione automatica**

Il bambino tenuto eretto e appoggiato con i piedi, se inclinato in avanti mantenendo l'appoggio con leggera pressione, dimostrerà risposte automatiche di estensione e flessione delle gambe, riproducendo l'automatismo della camminata. Il riflesso scomparirà a 2 mesi.



- **Riflesso di prensione o Grasping-Reflex**

Stimolando il palmo della mano con un dito o un oggetto allungato, si genera una reazione di presa a pugno senza flessione del pollice. Se di una certa intensità si può giungere a sollevare il bambino dal piano per qualche istante. Scompare verso i 9-10 mesi con l'inizio della capacità di rilassamento volontario.



- **Riflesso di suzione e deglutizione**

Lo sfioramento all'angolo della bocca , provoca la rotazione della testa in direzione dello stimolo (cercamento), in seguito le labbra e la lingua effettuano una reazione di avvicinamento allo stimolo. La lingua si ritira, le labbra si chiudono e avviene la suzione. La fase di cercamento scompare verso i 3-4 mesi, mentre il riflesso di suzione al 10-11 mese.



Il riflesso di deglutizione si scatena con il contatto dell'alimento con la parete della faringe. È un riflesso di tipo definitivo.

- **Riflesso tonico asimmetrico del collo**

Con le rotazione laterale della testa del neonato posto supino si determina una variazione del tono degli arti superiori con l'estensione dell'arto facciale e flessione di quello nucale. Dura solo nelle prime settimane.

